

定期予防接種			
●ワクチンの種類と標準的な接種期間			
ロタウイルス	初回接種は生後2か月に至った日から出生14週6日後までに接種 ＜ロタリックス1価＞ 2回目は27日以上の間隔をおいて接種 ＜ロタテック5価＞ 2回目以降は27日以上の間隔をおいて接種		
小児肺炎球菌	＜初回接種 3回＞ 生後2か月から7か月に至るまでの間に、27日以上の間隔をおいて3回接種 ＜追加接種 1回＞ 初回接種終了後60日以上の間隔をおいて、生後12か月から15か月に至るまでに接種		
B型肝炎	生後2か月に至った時から9か月に至るまでの間に3回接種 ＜1回目＞ 生後2か月に至ったときから ＜2回目＞ 1回目から27日以上の間隔をおいて接種 ＜3回目＞ 1回目から139日以上の間隔をおいて接種		
インフルエンザ菌b型 (Hib) ジフテリア 百日せき 破傷風 ポリオ ＜五種混合＞	＜第1期初回 3回＞ 生後2か月から生後7か月に至るまでの期間に20日から56日までの間隔をおいて3回接種 ＜第1期追加 1回＞ 第1期初回接種終了後6か月から18か月までの間隔をおいて接種 ＜第2期 1回＞ 小学校6年生（ジフテリア・破傷風）		
BCG	生後5か月に達したときから8か月に達するまでの期間に接種		
麻しん（はしか） 風しん ＜MR＞	＜第1期 1回＞ 生後12か月から24か月に至るまでの間に接種 ＜第2期 1回＞ 5歳以上7歳未満で小学校就学の始期に達する日の前日までの間に接種		
水痘	＜1回目＞ 生後12か月から15か月に至るまでに接種 ＜2回目＞ 1回目の接種終了後6か月から12か月に至るまでの間隔をおいて接種		
日本脳炎	＜第1期初回 2回＞ 3歳に達した時から4歳に達するまでの期間に、6日から28日までの間隔をおいて2回接種 ＜第1期追加 1回＞ 初回接種終了後おおむね1年を経過し、4歳に達した時から5歳に達するまでの期間に接種 ＜第2期 1回＞ 9歳に達した時から10歳に達するまでの期間に接種		
●保健福祉センターでの予防接種			
受 付 時 間		16:00 ～ 16:15	
4月	1日（水）・22日（水）	10月	14日（水）
5月	13日（水）・27日（水）	11月	4日（水）
6月	10日（水）・24日（水）	12月	2日（水）・23日（水）
7月	1日（水）・15日（水）	1月	6日（水）・27日（水）
8月	5日（水）・19日（水）	2月	3日（水）・24日（水）
9月	2日（水）・16日（水）	3月	3日（水）・24日（水）

★標準的な接種期間外でも定期接種対象となるものもありますので、接種対象・期間についての詳細は下記までお問い合わせいただくか、新生児訪問等で配布された冊子「予防接種と子どもの健康」をご参照ください。

★持ち物：母子健康手帳、予診票（新生児訪問等で配布）

★37.5℃以上の発熱がある場合は接種できません。

★保健福祉センターでの接種は希望日の1週間前までにお申し込みください。

★複数のワクチンの同時接種及びロタウイルスワクチン接種については、町立中標津病院で接種となります。※お申込みは二次元コードから。

★お問い合わせ先：管理・保健予防担当

